

說明:一、選擇題用 2B 鉛筆在「答案卡」上作答,修正時應以橡皮擦擦拭,切勿使用修正液(帶),未遵照正確作答方法而致電腦無法判讀者,考生自行負責。

二、試題及答案卡必須繳回,不得攜出試場。

【單選題】共 50 題,每題答對得 2 分,答錯不倒扣,共計 100 分。

1. 分佈在牙齒髓腔內的神經是下列何者?  
 (A) 顏面神經 (B) 迷走神經 (C) 三叉神經 (D) 舌咽神經
2. 下列何者是身體內最硬的組織?  
 (A) 骨 (B) 牙釉質 (C) 牙本質 (D) 牙骨質
3. 氟大部份之排泄由下列何器官完成?  
 (A) 胃 (B) 小腸 (C) 膀胱 (D) 腎
4. 舌尖對下列何者味道較敏感?  
 (A) 酸 (B) 甜 (C) 苦 (D) 辣
5. 裂溝封填劑的使用時機,下列何者為錯誤?  
 (A) 健康牙齒上較深且窄不易清潔的小窩 (B) 剛萌出不久尚未有齲蝕的牙齒  
 (C) 白齒咬合面橫脊旁,未齲蝕的裂溝 (D) 出現牙齒鄰接面的病兆
6. 下列哪一種處理牙齒脫落的方法是正確的?  
 (A) 將牙齒直接拿在手上,立即就醫 (B) 只要在 2 小時以內植回,其成功率都相同  
 (C) 乳牙脫落時,通常不應再植回 (D) 固定時間越久越好
7. 局部塗氟使用氟化鈉(Sodium Fluoride)的濃度為?  
 (A) 2% (B) 3% (C) 5% (D) 7%
8. 口腔衛生教育開放式教學,主要以誰為中心?  
 (A) 學生 (B) 老師 (C) 牙醫師 (D) 校護
9. 飲水加氟在牙齒發育的哪個階段最有效?  
 (A) 分泌期 (B) 增生期 (C) 鈣化期 (D) 萌出期
10. 下列何者不是法定傳染病?  
 (A) 霍亂(cholera) (B) 瘧疾(malaria) (C) 痢疾(dysentery) (D) 傷寒(typhoid fever)
11. 愛滋病(AIDS)的病毒(HIV)在下列何種體液中的濃度最低?  
 (A) 血液 (B) 精液  
 (C) 唾液 (D) 在上述體液中濃度一樣,並無差別
12. 以 FDI system 國內健保申報時指定的標記法所述,83 是指下列哪一顆牙齒?  
 (A) 右上乳犬齒 (B) 右下乳犬齒 (C) 左上乳犬齒 (D) 左下乳犬齒
13. 對於學齡兒童的大白齒,其預防齲蛀最有效的方法是?  
 (A) 含氟漱口水 (B) 局部塗氟膠 (C) 口服氟錠 (D) 接受裂溝封閉劑充填
14. 下列何者的糖分含量導致其齲齒分數最高?  
 (A) 香蕉 (B) 可樂 (C) 蔗糖 (D) 牛奶
15. 所謂「六歲齒」是哪種牙齒的俗稱?  
 (A) 門齒 (B) 智齒 (C) 第一大白齒 (D) 第一小白齒
16. 牙面裂溝封填劑可預防牙齒哪個部位齲齒發生?  
 (A) 鄰接面 (B) 咬合面 (C) 唇面 (D) 舌面
17. 牙周病的致病原是屬於下列哪一項?

- (A) 細菌 (B) 病毒 (C) 黴菌 (D) 寄生蟲
18. 下列微生物何者是齲齒之病原菌？  
 (A) 突變形鏈球菌 (B) 乳酸桿菌 (C) 牙蟲 (D) 白色念珠菌
19. 最有效之防齲齒物質是？  
 (A) 鈣 (B) 鎂 (C) 氟 (D) 磷
20. 健康者口腔中之酸鹼度應為？  
 (A) 微酸性 (B) 強酸性 (C) 微鹼性 (D) 強鹼性
21. 正常牙周囊帶之深度？  
 (A) 1 至 3 mm (B) 3 至 5 mm (C) 0 mm (D) 5 至 7 mm
22. 牙周病與下列哪一項系統有密切的關聯性發生？  
 (A) 免疫系統 (B) 凝血系統 (C) 神經系統 (D) 消化系統
23. 幼童的口腔黏膜出現許多小潰瘍，要懷疑是哪種病原體感染？  
 (A) 細菌 (B) 病毒 (C) 黴菌 (D) 寄生蟲
24. 下列之敘述何者為錯誤？  
 (A) 猛爆性齲齒和奶瓶性齲齒皆有許多牙齒受到侵犯  
 (B) 猛爆性齲齒和奶瓶性齲齒皆發生快速  
 (C) 奶瓶性齲齒時的下顎前牙通常很容易受到波及而齲齒  
 (D) 猛爆性齲齒時下顎前牙鄰接面為易受齲蝕之處
25. 從預防層級觀點，下列何者是最高的層級？  
 (A) 早期診斷立即治療 (B) 復健 (C) 健康促進 (D) 特殊保健
26. 舌根的一般知覺和味覺是由下列何神經所支配？  
 (A) 上顎神經的分枝翼腭神經 (pterygopalatine nerve)  
 (B) 舌下神經 (hypoglossal nerve)  
 (C) 下顎神經的分枝舌神經 (lingual nerve)  
 (D) 舌咽神經 (glossopharyngeal nerve) 的終末枝
27. 下顎乳牙中何者牙冠最長？  
 (A) 乳正中門齒 (B) 乳側門齒 (C) 乳犬齒 (D) 第二乳白齒
28. 乳牙鈣化最早開始於何時？  
 (A) 子宮內第三至四個月 (B) 子宮內第六週  
 (C) 出生時 (D) 出生後第六週
29. 世界衛生組織 (WHO) 在 1986 年指出，從事衛生領域的人員應對下列何方向付出更多責任？  
 (A) 治療 (curative) 服務 (B) 心理 (mental) 疾病的研究  
 (C) 復健 (rehabilitation) 領域 (D) 促進健康 (health promotion)
30. 口腔衛生師對一般傳染病感染預防的最佳策略為何？  
 (A) 戴手套+戴口罩 (B) 戴口罩+勤洗手 (C) 戴手套+勤洗手 (D) 完全不與病患接觸
31. 以三段五級的概念來看，疾病篩檢是屬於那一個階段的工作？  
 (A) 初段預防的健康促進 (B) 初段預防的特殊保護  
 (C) 次段預防 (D) 三段預防
32. 口腔衛生師在校園中施行口腔保健計畫，一學期後發現學生齲齒率降低 5%，此評價方式稱為？  
 (A) 過程評價 (process evaluation) (B) 結果評價 (outcome evaluation)  
 (C) 衝擊評價 (impact evaluation) (D) 結構評價 (structure evaluation)
33. 家庭成員的口腔衛生保健觀念及行為、生活方式等，受到下列何者影響最深？  
 (A) 家庭的角色 (B) 家庭的溝通方式 (C) 家庭的價值觀 (D) 家庭的決策過程
34. 下列何者屬於「口腔衛生師的專業性照護」？

- (A) 健康問題評估      (B) 排泄物清理      (C) 抽痰      (D) 依醫囑給藥
35. 下列何者屬於臨床口腔衛生照護護理人員規劃的範圍？  
 (A) 明確說明管理目標、任務、知識及事實      (B) 擬訂病人及其家庭成員短期和長期的目標  
 (C) 檢測政策問題，提供安全有品質護理      (D) 護理人員參與協調共擬預算計畫目標
36. 在三段五級的預防理論中，口腔衛生教育是屬於？  
 (A) 第一段預防      (B) 第二段預防      (C) 第三段預防      (D) 第五級預防
37. 使社區民眾獲得氟化物最有效、經濟和便捷的方法為何？  
 (A) 使用含氟牙膏刷牙      (B) 使用含氟漱口水漱口  
 (C) 到牙醫診所找牙醫師使用氟膠      (D) 自來水中加氟
38. 下列何者不是與口腔癌有關之危險因子？  
 (A) 甜食      (B) 檳榔      (C) 抽菸      (D) 病毒
39. 下列何者不是牙周病流行病學常用之指標？  
 (A) DMFT index      (B) CPITN index      (C) OHI index      (D) GI index
40. 口腔衛生教育的內容包括下列何項？  
 ①潔牙      ②氟化物之應用      ③飲食衛生與營養      ④感染控制  
 (A) 只有①②③      (B) 只有②③④      (C) 只有①③④      (D) ①②③④
41. 目前國內學校的衛生教育方面，最常使用的『三三模式』中並不包含下列何者？  
 (A) 學校健康指導      (B) 學校健康服務      (C) 學校健康活動      (D) 學校健康教學
42. 最有效的防齲牙膏中含有下列何者？  
 (A) 抗生素      (B) 葉綠素      (C) 抗酵素      (D) 氟化物
43. 口腔四大主要流行疾病包括下列何者？  
 ①齲齒      ②牙周病      ③咬合不正      ④口腔癌  
 ⑤顳顎關節症候群      ⑥顎面外傷  
 (A) ①②③④      (B) ②③④⑤      (C) ③④⑤⑥      (D) ①④⑤⑥
44. 協助失能老人做口腔功能的復健，其主要項目不包括下列何者？  
 (A) 進食      (B) 發音      (C) 吞嚥      (D) 頭部運動
45. 影響小孩到牙科就診之最大心理障礙為何？  
 (A) 害怕不知道會發生甚麼事      (B) 父母的態度  
 (C) 同儕之態度      (D) 師長之態度
46. 下列何種牙科處置是先天性心臟病患者的禁忌？  
 (A) 預後不好的乳白齒的根管治療      (B) 恆前齒的根管治療  
 (C) 即將脫落乳牙的拔除      (D) 下顎神經傳導麻醉
47. 唐氏症兒童較易罹患嚴重之牙周病，下列何者錯誤？  
 (A) 基因遺傳      (B) 免疫力升高      (C) 血液循環不良      (D) 牙齒形態異常
48. 美國兒童牙醫學會 (AAPD) 所定義的早期兒童齲齒 (early childhood caries, ECC) 指的是幾個月大以前的兒童？  
 (A) 6      (B) 12      (C) 36      (D) 71
49. 小朋友第一次看牙時，小朋友的不配合行為會深深受到高度焦慮 (anxiety) 的媽媽影響，下列那一年齡層最會受到影響？  
 (A) 4歲以下      (B) 5-7歲      (C) 8-10歲      (D) 11-13歲
50. 下列何者為罹患齲齒的高危險群？  
 (A) 唾液分泌量多      (B) 肉類攝取量多      (C) 蔬果攝取種類多      (D) 突變形鏈球菌數目多